定期予防接種　※予防接種の最新情報は町ホームページ等でご確認ください。

	種　類		対象年齢	標準的な接種年齢	望ましい接種方法
不活化ワクチン	インフルエンザ菌b型（ヒブ）		生後2月～5歳未満	生後2月～7月未満	初回：27～56日以内の間隔で3回接種 追加：初回終了後7～13月の間に1回接種 ※接種開始年齢により接種回数・間隔が異なります。 ※生後7月以降に接種する場合は、予診票の交換が必要です。
	小児用肺炎球菌			初回： 生後2月～7月未満 追加： 1 歳～1歳3月未満	初回：2歳までに27日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後60日以上の間隔で1歳以降に1回接種 ※接種開始年齢により接種回数・間隔が異なります。 ※生後7月以降に接種する場合は、予診票の交換が必要です。
	B型肝炎		1歳未満	生後2月～9月未満	27日以上の間隔で2回接種 1回目の接種より139日以上の間隔で1回（3回目）接種
	4種混合（ポリオ・百日咳・ジフテリア・破傷風）		生後2月～7歳6月未満	1期初回： 生後2月～1歳未満	1期初回：20～56日までの間隔で3回接種
				1期追加： 初回接種終了後12月～18月までの間	1期追加：1 期初回（3 回目）接種終了後12月～18月までの間に接種
	※5種混合（ポリオ・百日咳・ジフテリア・破傷風・インフルエンザ菌b型）		生後2月～7歳6月未満	1期初回： 生後2月～7 月未満	1期初回：20～56日までの間隔で3回接種
				1期追加： 初回接種終了後12月～18月までの間	1期追加：1 期初回（3 回目）接種終了後 6 月～18月までの間に接種
	日本脳炎		生後6月～7歳6月未満	1期初回： 3歳～4歳未満	1期初回：3歳～4歳までの間に6日以上28日までの間隔で2回接種
				1期追加： 4歳～5歳未満	1期追加：4歳～5 歳までの間に1回（3回目）接種 （初回接種終了後6月以上概ね1年の間隔をあけて接種）
生ワクチン	ロタウイルス	ロタリックス	出生6週0日後～24週0日後まで		初回投与：出生6週0日後～出生14週6日後 2回目投与：初回投与後27日後～出生24週0日後までに接種
		ロタテック	出生6週0日後～32週0日後まで		初回投与：出生6週0日後～出生14週6日後 2回目投与：初回投与後27日後以降 3回目投与：2回目投与後27日後～出生32週0日後までに接種
	BCG		1歳未満	生後5月～8月未満	1回接種
	水痘（水ぼうそう）		1歳～3歳未満	1回目： 1歳～1歳3月未満	1回目接種後6月～12月までの間に2回目を接種
				2回目： 1回目接種後6月～12月までの間	
	MR（麻しん風しん）	1期	1歳～2歳未満		1回接種
		2期	就学前1年間（年長児）		1回接種

※令和6年4月から5種混合ワクチンが定期接種化されました。5種混合ワクチンを接種する場合、4種混合＋ヒブは接種しません。ただし予防接種は原則同一のワクチンで接種を完了することとされています。すでに4種混合とヒブで接種を開始している場合は、4種混合とヒブで規定回数を接種してください。なお、メーカーによる4種混合ワクチンの販売終了に伴い、令和7年7月頃にワクチンの在庫がなくなる予定です。接種が完了していない場合は、早めに医療機関にご相談ください。4種混合ワクチンの在庫がなくなった場合、5種混合ワクチンに切り替えての接種が可能です。その際は予診票の差し替えが必要ですので、母子健康手帳、差し替え希望の予診票をご持参のうえ、こども保健推進室までお越しください。

【接種間隔について～3つのルール～】　接種日を0日とし翌日から1日と数えます。

① **注射生ワクチン** → 27日以上あける → **注射生ワクチン**

※注射生ワクチン：BCG、麻しん風しん、おたふくかぜ、水痘

② 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合はワクチンごとに決められた間隔をあけて接種する。

③ 発熱や接種部位の腫脹（はれ）がないこと、体調がよいことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種する。

⇒ 上記の3つのルールを守っている場合には、次のワクチンの接種を受けるまでの間隔に制限はありません。