


定期予防接種

※予防接種の最新情報は町ホームページ等でご確認ください。

種 類		対象年齢	標準的な接種年齢	望ましい接種方法	
不 活 化 ワ ク チ ン	小児用肺炎球菌	生後2月～ 5歳未満	初回： 生後2月～7月未満 追加： 1歳～1歳3月未満	初回：1歳までに27日以上の間隔をあけて3回接種 追加：初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1歳以降に1回接種 ※接種開始年齢により接種回数・間隔が異なります。 ※生後7月以降に接種を開始する場合は、予診票の交換が必要です。	
	B型肝炎	1歳未満	生後2月～9月未満	27日以上の間隔をあけて2回接種後、1回目の接種から139日以上の間隔をあけて1回(3回目)接種	
	5種混合 (百日咳・ジフテリア・ 破傷風・ポリオ・ ヒブ感染症)	生後2月～ 7歳6月未満	1期初回： 生後2月～7月未満 1期追加： 1期初回接種終了後 6月～18月までの間	20～56日までの間隔をあけて3回接種 1期初回接種終了後6月～18月までの間隔をあけて接種	
	日本脳炎	生後6月～ 7歳6月未満	1期初回： 3歳～4歳未満 1期追加： 4歳～5歳未満	6日～28日までの間隔をあけて2回接種 1期初回接種終了後、概ね1年後に1回接種	
生 ワ ク チ ン	ロタ ウイルス	ロタ リックス	出生6週0日 後～24週0 日後まで	1回目接種については生後2月～出生 14週6日後まで	27日以上の間隔をあけて2回接種
		ロタ テック	出生6週0日 後～32週0 日後まで		27日以上の間隔をあけて3回接種
	BCG	1歳未満	生後5月～8月未満	1回接種	
	水痘 (水ぼうそう)	1歳～ 3歳未満	1回目： 1歳～1歳3月未満 2回目： 1回目接種後6月～ 12月までの間	1回目接種後6月以上12月未満の間隔をあけて2回目を接種	
	MR (麻しん 風しん)	1期	1歳～2歳未満	1回接種	
	2期	就学前1年間(年長児)	1回接種		

【接種間隔について～3つのルール～】 接種日を0日とし翌日から1日と数えます。



※注射生ワクチン：BCG、麻しん風しん、おたふくかぜ、水痘

- ② 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合はワクチンごとに決められた間隔をあけて接種する。
 - ③ 発熱や接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調がよいことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種する。
- ⇒ 上記の3つのルールを守っている場合には、次のワクチンの接種を受けるまでの間隔に制限はありません。